



Madrid, a 27 de abril de 2007

## RECOMENDACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA EN RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN FRENTE A PAROTIDITIS

La Dirección General de Salud Pública y Alimentación, a través de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid ha detectado, en las últimas semanas, un incremento de casos de parotiditis y se piensa que la acumulación de susceptibles está favoreciendo la circulación del virus en la población.

La enfermedad está afectando con mayor frecuencia a los grupos de población que no han recibido dos dosis de vacuna triple vírica con el componente frente a la parotiditis **Jeryl Lynn** (VACUNA MSD TRIPLE ANTI-SARAMPIÓN, RUBÉOLA, PAROTIDITIS® distribuida por Sanofi Pasteur), **Urabe** (distribuida por SKF) o **RIT 4385** (Priorix® distribuida por GSK). Esta circunstancia ocurre cuando han recibido una sola dosis de vacuna o bien porque han recibido dos dosis pero una de ellas contenía la cepa Rubini (Triviraten® de Berna) frente a la parotiditis, de menor efectividad y que por ello se retiró del mercado español.

Por todo ello, para asegurar que tengan administradas dos dosis de vacuna triple vírica que sean cepa **Jeryl Lynn, Urabe o RIT 4385**, se recomienda revisar el estado de vacunación de los siguientes grupos de edad:

- **Personas nacidas entre 1 de enero de 1995 y 31 de diciembre de 1998 (con edades entre 9 y 12 años en 2007)**
- **Personas nacidas entre 1 de enero de 1985 y 31 de diciembre de 1988 (con edades entre 22 y 19 años en 2007)**

En definitiva, en estos grupos, procede reforzar la inmunidad cuando no esté documentada la administración de dos dosis de vacuna con la cepa **Jeryl Lynn, Urabe o RIT 4385**.

Finalmente, se recuerda la conveniencia de revisar el calendario vacunal en todos los pacientes que acudan a consulta y completarlo, si es necesario.

Agustín Rivero Cuadrado  
Director General de Salud Pública y Alimentación