



NOTA INFORMATIVA SOBRE VACUNACIÓN FRENTE A PAROTIDITIS

Con motivo de la revisión del estado de vacunación frente a la parotiditis, de las personas pertenecientes a las cohortes nacidas entre 1985-1988 y 1995-1998, se han recibido preguntas sobre pautas de vacunación con vacuna triple vírica, en personas con dosis previas de diferentes cepas. La recomendación desde la Dirección General Salud Pública y Alimentación, para vacunar en estas cohortes con triple vírica, son:

- Personas que no tengan puestas ninguna dosis, se administrarán dos dosis de Jeryl Lyn, separadas con un intervalo, al menos, de cuatro semanas entre dosis.
- Personas que tengan una única dosis puesta de cepa Jeryl Lyn, Urabe o RIT 4385, se administrará una segunda dosis de Jeryl Lyn.
- Personas que tengan una única dosis de vacuna, con la cepa Rubini, se administrarán dos dosis de Jeryl Lyn separadas con un intervalo, al menos, de cuatro semanas entre dosis.
- Personas con dos dosis, una de ellas pertenecientes a la cepa Rubini, se administrará una única dosis de cepa Jeryl Lyn.
- Personas con dos dosis de la cepa Rubini, se administrará una tercera dosis de cepa Jeryl Lyn.
- Personas con tres dosis o más y que dos de ellas sean de cepa Rubini, no se le administrarán más dosis.

Conscientes de que pudiera haber alguna particularidad en otras personas que no pudiera estar contemplada en la anterior información, es el Pediatra quien debe valorarla. Desde el Servicio de Prevención se contestará a todas las cuestiones que desde Pediatría se quieran plantear llamando al teléfono 912052343.

Madrid a 14 de mayo de 2007